



# Grandes Cultures

Service Régional de la  
Protection des  
Végétaux  
ILE DE FRANCE  
10 rue du séminaire  
94516 RUNGIS cedex  
Tél : 01-41-73-48-00  
Fax : 01-41-73-48-48

Imprimé à la station  
D'Avertissements  
Agricoles de Rungis  
Directeur gérant :  
J. BOULUD

Publication périodique  
C.P.P.A.P n°536 AD  
ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 340 F  
Fax 425 F

DLP 14-11-01009657

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 31 du 13 octobre 1998 - 2 pages - numéro ordre postal : 67

### Colza

STADE : 4-6 feuilles (8 maxi).

### Ravageurs

#### Altises

Quelques nouvelles captures enregistrées dans certains sites de l'Essonne et de la Seine et Marne. Les cumuls restent bas (voir carte).

#### Tenthredes

Les captures sont marginales sur l'ensemble du réseau (voir carte). Pas de dégâts importants liés aux chenilles signalés.

#### Charançon du bourgeon terminal

Pas de captures depuis la semaine dernière.

#### Pucerons

Les niveaux d'infestation ont tendance à augmenter : plusieurs parcelles atteignent ou dépassent les 10% de pieds porteurs (en général d'1 ou 2 pucerons) surtout dans l'Essonne et une partie de la Seine et Marne (voir carte). Ce sont essentiellement des pucerons verts qui sont présents, mais on trouve aussi quelques pucerons cendrés (Maise, Vexin).

Les conditions climatiques plus clémentes annoncées peuvent favoriser le développement des colonies.

On peut trouver aussi des Rhopalosiphum padi, pucerons des céréales, suite à l'élimination des repousses de graminées. Ils ne sont pas nuisibles sur colza.

*Dans les parcelles proches de seuil de 20% de pieds porteurs de pucerons, une intervention insecticide est à envisager dès que possible. En Seine et Marne, département le plus concerné par le charançon du bourgeon terminal, l'intervention peut être différée dans la mesure du possible, sur les parcelles peu ou pas attaquées par les pucerons, pour coïncider avec le traitement charançon.*

### Maladies

#### Mildiou

Avec les conditions humides, les symptômes sont bien visibles sur les cotylédons : jaunissement de la face supérieure, feutrage blanchâtre à la face inférieure. Aucun caractère de gravité.

#### Phoma

Des projections ont été enregistrées dans un de nos 3 sites de suivi (Le Chatelet en Brie). En région Centre, les premières projections ont démarré le plus souvent depuis le 28/9. On n'a pas encore de véritables pics de projections.

*De nouvelles projections pourront certainement avoir lieu aux prochaines pluies. Les situations qui peuvent faire l'objet d'une protection sont les variétés sensibles (BRISTOL) n'ayant pas atteint le stade 6-8 feuilles.*

*La rentabilité de cette intervention n'est pas garantie.*

*Produits utilisables : ERIA 2l ou IMPACT R 1.25l ou YELLOW 1l.*

### Céréales

#### Ravageurs

Les semis de fin septembre sont généralement levés. Un certain nombre de parcelles présentent déjà, malgré la période humide que l'on vient de connaître, des niveaux de colonisation par les pucerons de 5 voire jusqu'à 10%. Au niveau des cicadelles, les piégeages sont moins nombreux que les années précédentes, jusqu'à ce jour, dans la plupart des régions concernées.

*Observez vos parcelles levées, aux heures les plus chaudes de la journée. Sur les parcelles non protégées GAUCHO, une intervention doit s'envisager si 10% des pieds sont porteurs de pucerons.*

Colza et  
Céréales  
Attention aux  
pucerons.

BnF  
S&T

5340 J 48744

731

